


Guía terapéutica en INTENSIVOS PEDIÁTRICOS

**Guía terapéutica en
INTENSIVOS PEDIÁTRICOS**

5ª edición



Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos
Hospital Sant Joan de Déu



Intubación endotraqueal

Edad	Peso (kg)	Diám. int. (mm) N°	Diám. ext. (mm)	cm hasta labio	cm hasta nariz	N° sonda aspirac.
RN	< 1	2,5	3,6	5,5	7	6
RN	1-2	3,0	4,3	6	7,5	7
RN	> 2	3,5	4,9	9	11	8
3 m	6	3,5	4,9	10	12	8
1 a	10	4,0	5,6	11	14	8
2 a	12	4,5	6,2	12	15	8
3 a	14	4,5	6,2	13	16	8
4 a	16	5,0	6,9	14	17	10
6 a	20	5,5	7,5	15	19	10
8 a	24	6,0	8,2	16	20	10
10 a	30	6,5	8,9	17	21	12
12 a	38	7,0	9,5	18	22	12
14 a	50	7,5	10,2	19	23	12
Adulto	60	8,0	10,8	20	24	12
Adulto	70	9,0	12,1	21	25	12

Tamaño tubo (mm) en > 2 años = edad (años) + 16 / 4.

Máscara laríngea: número y volumen de inflado (ml)

< 5 kg	1 (4 ml)	30-50 kg	3 (20 ml)
5-10 kg	1,5 (7 ml)	50-70 kg	4 (30 ml)
10-20 kg	2 (10 ml)	70-100 kg	5 (40 ml)
20-30 kg	2,5 (14 ml)	> 100 kg	6 (50 ml)

Estimación TET

Tubo sin balón (> 2 a). N° = edad (a) / 4 + 4

Tubo con balón (> 2 a). N° = edad (a) / 4 + 3

Distancia (a comisura bucal):

- cm = (edad (a) / 2) + 12
- cm = N° x 3